



ヨシダ製薬

備えて安心シリーズ!!

感染症流行時の衛生対策、非常時のための備蓄にも最適

指定医薬部外品

薬用手指消毒液

# エタリーフ

販売名:ラウマーA薬用手指消毒液

手指消毒用ベンザルコニウムエタノール製剤

- ベンザルコニウム塩化物0.05<sup>w/v</sup>%を含有した薬用手指消毒液です
- エタノール濃度は約65vol% (58<sup>w/w</sup>%)です
- 消防法の危険物に該当しません



第2類医薬品

殺菌消毒薬 [塩素系消毒薬]

## ジクロシア<sup>®</sup>

## ジクロシア<sup>®</sup>0.5g錠

## ジクロシア<sup>®</sup>2.5g錠

ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム製剤

ジクロシア製剤(ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム)は水に溶かすと次亜塩素酸を生成し、同濃度の次亜塩素酸ナトリウム液とほぼ同等の殺菌効果を有します



効能効果

- 哺乳びんと乳首の消毒殺菌
- 医療器具の消毒
- 器具・物品などの消毒
- 室内・便所・浴室の消毒

第3類医薬品

殺菌消毒剤 [日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液]

## 逆性石ケン液10P「ヨシダ」

ベンザルコニウム塩化物10<sup>w/v</sup>%水溶液

- 広範囲の細菌、真菌、一部のウイルスに対して幅広い抗微生物スペクトルを示します
- 刺激性が少なく低濃度で効果を発揮します



# 薬用手指消毒液 エタリーフ

●手指消毒用ベンザルコニウムエタノール製剤

指定医薬部外品 販売名：ラウマー A 薬用手指消毒液

内容量 470ml

貯法：室温保存 使用期限：3年（ラベルに記載）

## 【成分】

有効成分：ベンザルコニウム塩化物(0.05w/v%)

添加物：エタノール(エタノール約65vol%)、グリセリン、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、pH調整剤、水

## 【用法・用量】

適量を手指にとり、塗布又は塗擦する。

## <用法・用量に関する注意>

(1)用法用量を厳守すること。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4)外用にのみ使用すること。

## 【効能・効果】

手指・皮膚の洗浄・消毒

## 【使用上の注意】

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

(1)患部が広範囲の人。(2)深い傷やひどいやけどの人。

### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)火気に近づけないこと。

製造販売元

万協製薬株式会社  
三重県多気郡多気町五桂1169-142

2020年11月作成

## 殺菌消毒薬 第2類医薬品

# ジクロシア<sup>®</sup> ジクロシア0.5g錠 ジクロシア2.5g錠

Dichlosia, Dichlosia 0.5g・2.5g tab.

●ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム製剤

品名	ジクロシア <sup>®</sup>	ジクロシア <sup>®</sup> 0.5g錠	ジクロシア <sup>®</sup> 2.5g錠
区分	一般用医薬品	一般用医薬品	一般用医薬品
承認番号	21400APZ00618000	22300APX00719000	22800APX00287000
販売開始	2003年7月	2012年7月	2017年6月
包装	ポリ500g	バラ100錠	バラ30錠

貯法：室温保存 使用期限：3年（容器に記載）

### まぜるな危険

酸性の洗浄・漂白剤、シアヌール酸系の製品と混合すると塩素ガスが発生して危険ですのでおやめください。

- 本品は飲まないでください。
- 手の荒れやすい方は、取扱い時に炊事用手袋などをご使用ください。

## 【成分及び分量】

ジクロシア<sup>®</sup>：本品1g中ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム500mg。添加物として、炭酸水素ナトリウム、コハク酸を含む。

ジクロシア<sup>®</sup>0.5g錠：本品1錠中ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム500mg。添加物として、アジピン酸、炭酸水素ナトリウムを含む。(参考)直径12mm×厚さ5.6mm、重さ1g  
ジクロシア<sup>®</sup>2.5g錠：本品1錠中ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム2.5g。添加物として、アジピン酸、炭酸水素ナトリウムを含む。(参考)直径20mm×厚さ11mm、重さ5g

## 【使用上の注意】

### 相談すること

1. 本品をあらかじめ飲み込んだ時は、すぐに水、生卵、ミルク等を飲み、この製品を持って医師に相談してください。
2. 目に入らないように注意してください。目に入った場合には、こすらずにすぐに水又はぬるま湯で十分に洗い流してください。なお、症状が重い場合には、この製品を持って眼科医に相談してください。
3. 本品の溶液との接触により、手の荒れ、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果、用法・用量】

哺乳びん・乳首の消毒殺菌

ジクロシア<sup>®</sup>：水2L当たり本品1gを溶かした液に1時間以上浸す。

ジクロシア<sup>®</sup>0.5g錠：水2L当たり本品1錠を溶かした液に1時間以上浸す。

ジクロシア<sup>®</sup>2.5g錠：水10L当たり本品1錠を溶かした液に1時間以上浸す。

## 医療器具の消毒：

ジクロシア<sup>®</sup>：水1L当たり本品1～2gを溶かした液に数分間浸すか、清拭する。

ジクロシア<sup>®</sup>0.5g錠：水1L当たり本品1～2錠を溶かした液に数分間浸すか、清拭する。

ジクロシア<sup>®</sup>2.5g錠：水5L当たり本品1～2錠を溶かした液に数分間浸すか、清拭する。

## 器具・物品などの消毒：

ジクロシア<sup>®</sup>：水1L当たり本品1～2gを溶かした液に数分間浸すか、清拭する。

ジクロシア<sup>®</sup>0.5g錠：水1L当たり本品1～2錠を溶かした液に数分間浸すか、清拭する。

ジクロシア<sup>®</sup>2.5g錠：水5L当たり本品1～2錠を溶かした液に数分間浸すか、清拭する。

## 室内・便所・浴室の消毒：

ジクロシア<sup>®</sup>：水1L当たり本品1～2gを溶かした液で清拭する。

ジクロシア<sup>®</sup>0.5g錠：水1L当たり本品1～2錠を溶かした液で清拭する。

ジクロシア<sup>®</sup>2.5g錠：水5L当たり本品1～2錠を溶かした液で清拭する。

(ジクロシア<sup>®</sup>については添付のスプーン1杯が1gです)

## 【用法・用量に関する注意】

1. 定められた用法・用量を厳守してください。
2. 換気のよい場所で使用してください。
3. 液体タイプの塩素系洗浄・漂白剤、酸性の洗浄・漂白剤等との混合は危険ですので避けてください。
4. 金属製の容器は用いないでください。また、哺乳びん・パサミ、スプーン等の金属製品や、指輪等貴金属を本品の溶液につけることも避けてください。メラミン食器等には、本品の使用を避けてください。
5. 調製後、本品の溶液が変色した場合、その水での調製を避けてください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かないところに保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 衣類等につくと脱色、変色することがありますので注意してください。
5. 殺菌消毒する製品によっては印刷面(文字、絵)、材質など変色・変質することがあります。

製造販売元

日産化学株式会社  
東京都中央区日本橋二丁目5番1号

2018年7月改訂(ジクロシア<sup>®</sup>) 2019年5月改訂(ジクロシア<sup>®</sup>0.5g錠、ジクロシア<sup>®</sup>2.5g錠)

区分	一般用医薬品
承認番号	21900APX00059000
販売開始	2010年2月
包装	ポリJ500mL

貯法：室温保存 使用期限：4年（ラベルに記載）

## 殺菌消毒剤 第3類医薬品

# 逆性石ケン液 10P「ヨシダ」

日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

●ベンザルコニウム塩化物10w/v%水溶液

## 【使用上の注意】

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 原液のまま使用しないでください。
2. 患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないでください。

## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)患部が広範囲の人(4)深い傷やひどいやけどの人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ等

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】

手指の殺菌・消毒、創傷面の殺菌・消毒、口腔内の殺菌・消毒

## 【その他の公衆衛生・家庭衛生分野での使用法】

- (1)食器・器具類の消毒 茶碗、皿、コップ、ナイフ、包丁類、調理器具等は水洗いした後、本剤の200～500倍液に5分間以上浸した後水洗いする。(2)家屋、乗物等の消毒 床、畳、家具、調度品、手洗い場、浴槽、便所、座席、手すり、電話機等は本剤の200～500倍液で清拭するか又は噴霧する。(3)塵芥箱、冷蔵庫の消毒 本剤の100～200倍液を噴霧する。(4)その他 食品工場、清涼飲料水工場、缶詰・製菓工場の施設、器具の消毒には本剤の200～500倍を用いる。

## 【用法・用量】

本品を次のように水で希釈して、塗布または洗浄する。

○手指の殺菌・消毒の場合：ベンザルコニウム塩化物として0.05～0.1%（本剤の100～200倍液）

○創傷面の殺菌・消毒の場合：ベンザルコニウム塩化物として0.01～0.025%（本剤の400～1,000倍液）

○お嗽の場合：ベンザルコニウム塩化物として0.005～0.01%（本剤の1,000～2,000倍液）

<希釈方法> 本剤のキャップ1杯は約5mLです。100倍液液…本剤キャップ2杯を1Lに溶かす。200倍液液…本剤キャップ1杯を水1Lに溶かす。

## (用法・用量に関する注意)

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)原液又は希釈した液が目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流して下さい。なお、症状が重い場合には、直ちに眼科医の診療を受けてください。(3)外用にのみ使用し、内服しないでください。(4)定められた用法・用量を厳守してください。(5)石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用してください。(6)皮革製品に付着した場合は、変質させることがあるので注意してください。(7)染色した布地は退色することがあるので注意してください。(8)原液又は濃厚液が皮膚に付着した場合は炎症を起こすことがあるので、すぐ水で洗い流してください。

## 【成分】

本品100mL中に、日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物10gを含有します。(ベンザルコニウム塩化物10w/v%水溶液)

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元

小堺製薬株式会社  
東京都墨田区両国4-36-9

2012年4月改訂

■効能・効果、用法・用量、使用上の注意等の改訂にご留意ください。

■詳細は製品添付文書をご参照ください。

ヨシダ製薬

吉田製薬 製品情報

発売元  
吉田製薬株式会社  
埼玉県狭山市南入曽951

文献請求先及び問い合わせ先  
吉田製薬株式会社  
東京都中野区中央5-1-10  
Tel: 03-3381-2004

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
http://www.pmda.go.jp/kenkouhijigaku/camp/index.html  
☎0120-149-931(フリーダイヤル)

©2011CL  
400162

2020年11月作成